

## 藥品到貨通知

院內碼	DBFLU1P
學名	Bfluid
商品名	Bfluid
規格	1000ml/bag
仿單	Bfluid 仿單
中文名稱	必富力得
藥廠	大塚製藥
藥品外觀	如下圖
藥品資訊	<p>一、 <u>適應症</u>：</p> <p>經口攝取不足、輕度的低蛋白血症、輕度的營養障礙、手術前後等狀態時的氨基酸、電解質、維生素B1及水分之營養補給。</p> <p>二、 <u>劑量與用法</u>：</p> <p>使用前，撕開外袋，用雙手壓下室以打開兩室間的連結處，使二室溶液完全混合。通常成人一回500毫升由末梢靜脈持續輸注。成人標準輸注速度為120分鐘內輸注500毫升。老人與重症患者應減緩輸注速度。劑量應依症狀、體重、年齡作適宜增減。每日最大投與劑量為2500毫升。</p> <p>三、 <u>副作用</u>：</p> <p>噁心、嘔吐、血管痛、靜脈炎。</p> <p>四、 <u>注意事項</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本劑500毫升中含有氨基酸15公克（氮素2.35公克）與非蛋白質熱量150 kcal。以本劑作為唯一營養來源無法達到每日熱量需求，因此本劑應只做為短期營養補充用。</li><li>2. 對經口攝取不足，而需以本劑補充營養的患者，應全面評估患者的營養需求和經口攝取量後再投與本劑。</li><li>3. 手術後單獨投與本劑，應限制其使用期間為3~5天，並應儘快開始經口、經腸等可行的營養補充方式。</li><li>4. 本劑500毫升中含有維生素B1 0.96毫克，做為維生素的來源。額外的維生素B1或其他的維生素的補充依患者的症狀而定。</li></ol> <p>五、 <u>使用禁忌</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 有肝性昏迷或有肝性昏迷之虞的患者。</li><li>2. 重症腎障礙或高氮血症患者。</li><li>3. 充血性心衰竭患者。</li><li>4. 嚴重酸中毒（高乳酸血症等）患者。</li><li>5. 電解質代謝異常患者。<ol style="list-style-type: none"><li>a. 高鉀血症患者（寡尿、Addison's症等）。</li><li>b. 高磷血症患者（副甲狀腺機能低下等）。</li><li>c. 高鎂血症患者（甲狀腺機能低下等）。</li><li>d. 高鈣血症患者。</li></ol></li><li>6. 因尿道阻塞而尿量減少的患者。</li><li>7. 氨基酸代謝異常患者。</li><li>8. 曾對維生素B1有過敏症的患者。</li></ol>

圖片



藥劑部 1040827