


藥品到貨通知

藥劑部 1040812

院內碼	DDYNA1P
學名	Parecoxib
商品名	Dynastat
規格	40mg/vial
仿單	Dynastat 仿單
中文名稱	得術泰
藥廠	輝瑞
藥品外觀	如下圖
藥品資訊	<p>一、 <u>適應症</u>：</p> <p>短期（不超過4天）使用於外科手術後疼痛之緩解。</p> <p>二、 <u>劑量與用法</u>：</p> <p>建議劑量為40mg，靜脈注射或肌肉注射，接著視需要每12至24小時可再給予20mg。</p> <p>三、 <u>副作用</u>：</p> <p>噁心、咽炎、低鉀血症、頭暈、周邊水腫。</p> <p>四、 <u>注意事項</u>：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 目前並無研究靜脈注射或肌肉注射以外的使用方式，因此不能使用其他的注射方式。2. 長期使用COX-2抑制劑伴隨發生心血管與血栓不良事件的風險增加。 <p>五、 <u>使用禁忌</u>：</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dynastat禁用於對本品之任何成分過敏的患者。2. 活動性之消化性潰瘍或胃腸出血。3. 懷孕第三期與授乳期。4. 重度肝功能不全。5. 充血性心衰竭。6. 在冠狀動脈繞道手術後，術後疼痛之治療。
圖片	 The image shows two glass vials of Dynastat 40mg injection powder. The vials are positioned in front of a blue ruler marked in centimeters. The left vial has a white label with Chinese text '得術泰 注射劑' and 'Dynastat'. The right vial has a white label with Chinese text '得術泰 注射劑 40毫克' and 'Dynastat 40mg'. Both labels also include the English name 'Parecoxib (as parecoxib sodium)' and instructions to read the package leaflet before use.